



FICHE PRATIQUE

Multiplier la pivoine arbustive méthodes et savoir-faire

Plante emblématique des jardins, **la pivoine arbustive** se multiplie selon des techniques spécifiques. Du greffage en incrustation au semis, tour d'horizon des pratiques utilisées par les professionnels.

Originaire exclusivement de Chine, la pivoine arbustive est une plante de montagne particulièrement résistante aux conditions climatiques extrêmes. Introduite en Europe à la fin du XVIII^e siècle, elle reste aujourd'hui une référence incontournable des jardins pour sa longévité et sa floraison spectaculaire.

Le greffage, méthode de référence

La multiplication professionnelle de la pivoine arbustive repose principalement sur le greffage en incrustation, pratiqué en août et septembre. Cette technique consiste à fixer un greffon de pivoine arbustive sur un porte-greffe constitué d'une racine de pivoine herbacée (*Paeonia lactiflora*).

Les racines du porte-greffe, prélevées en juillet, mesurent environ 10 cm et sont conservées dans du sable humide afin de favoriser la cicatrisation. Le greffon, issu d'un rameau de l'année, est préparé avec un à deux yeux, puis ajusté précisément dans une fente de forme identique pratiquée sur le porte-greffe.

Après ligature, la greffe est protégée par un passage rapide en paraffine chaude, puis plantée sous châssis dans un substrat drainant enrichi en matière organique. Le point de greffe doit être enterré de 5 à 10 cm afin de permettre l'affranchissement du greffon. Une surveillance régulière est indispensable : humidité légère, aération et prévention des maladies. La greffe reste en place au minimum un an, avec un taux de réussite moyen de 50 %.



FICHE PRATIQUE

Multiplier la pivoine arbustive méthodes et savoir-faire

Autres modes de multiplication

La division de touffes est possible mais présente peu d'intérêt en production professionnelle. Elle peut toutefois être envisagée par les particuliers lors d'une transplantation.

Le semis, quant à lui, permet d'obtenir des individus uniques. Les graines sont récoltées en octobre, stratifiées pendant un an, puis semées en substrat léger. La floraison n'intervient qu'après quatre à cinq années de culture.

Maladies et ravageurs

Les principales maladies sont d'origine fongique (botrytis, cladosporium, verticillium). Un sol bien drainé, une aération régulière et des arrosages modérés limitent leur apparition. Les ravageurs les plus courants restent l'otiorhynque, les thrips et les nématodes.