



FICHE PRATIQUE

RÉCOLTER DES FRUITS DANS SON JARDIN

Les arbres ou arbustes fruitiers ont des caractéristiques particulières pour chaque espèce et parfois pour chaque variété de la même espèce.

1) Avant toutes plantations, il faut prendre en compte certains critères. Nature du sol, Volume de l'arbre ou de l'arbuste adulte afin de l'adapter à la surface du terrain que l'on dispose, ne pas planter trop près d'un habitat et qu'il n'y ai pas trop d'ombre occasionnée par d'autres arbres de vos voisins, en fonction de cela il faut faire le choix entre des arbres dit de plein vent en forme libre pour un grand terrain (20 à 30 m²) par arbre ou d'espèces et de formes plus réduites (5 à 10 m²) voir moins pour cassissiers, groseilliers, framboisiers.

2) Effectuer les plantations de préférence entre le 15 Novembre et début Mars sans tasser le sol, c'est la pluie d'hiver qui positionnera la terre entre les racines et la terre restera aérée. Il faut penser à arroser la 1^{ère} année et si possible mettre un paillage afin de maintenir le sol frais pour une meilleure reprise de arbres et des arbustes.



FICHE PRATIQUE

RÉCOLTER DES FRUITS DANS SON JARDIN

3) Après quelques années, si tout se passe bien, les arbres et arbustes vont se développer et prendre leur forme. Premières récoltes espérées dès la 2ème année pour les framboisiers, groseilliers, cassissiers, muriers. Pour les arbres à noyaux et à pépins, c'est plutôt vers 4 à 5 ans voir 6 à 7 ans pour certains en grand volume.

4) Pendant les premières années la taille ne s'impose pas sauf pour les formes spécifiques ou adossées à un mur. La taille intervient lorsque l'arbre a atteint un certain volume afin de lui privilégier la lumière pour lui assurer le grossissement de ses fruits.

5) La production sera en fonction des caprices climatiques (gelées printanières, excès de pluies, travail des insectes pollinisateurs, parfois les arbres produisent trop de fruits, ils seront petits voir très petits et l'arbre s'épuisant a de fortes chances de ne pas avoir de fruits l'année suivante, c'est plus fréquent chez les pommiers et parfois chez les poiriers, pour remédier à cet inconvénient il faut manuellement retirer des fruits en surnombre (petits, déformés), voir à en laisser 1 seul par bouquet floral, pour limiter cette intervention possible d'anticiper par la taille en hiver, il faut tailler plus sévèrement (suppression de branches) lorsque l'on voit qu'il y a beaucoup de boutons floraux et tailler peu (couper que les gourmands) lorsqu'il y a peu de boutons floraux.